

철새에 의한 AI 바이러스 유입 방지를 위한 차단방역 수칙



야생조류의 접근과 철새분변과의 접촉을 차단하면 고병원성 AI 예방이 가능합니다.



구제역·AI 의심축 신고전화(국번없이)
1588-4060, 1666-0682으로
신고하여 주시기 바랍니다.

고병원성 조류인플루엔자는 철저한 차단방역과 주기적인 소독실시로 예방할 수 있습니다.



닭·오리 등 가축에서 폐사율 증가, 산란율 저하 및 임상증상 발현 등 의심축 발견 시
지체없이 **가축방역기관에 신고**하시기 바랍니다. (1588-4060, 1666-0682)

- 가금 농장주는 축사별(동별) 일일 폐사일지 및 산란일지를 매일 작성하고 1년 이상 보관

신고기준

- (폐사율) 동일 축사에서 이전 일주일 일평균 대비 2배 높게 폐사율 증가 시
- (산란율) 동일 축사에서 이전 일주일 일평균 산란율 대비 3%포인트 이상 산란율 저하 시
- (기타 임상증상) 닭(줄거나 청색증 관찰), 오리(녹변, 눈물자국, 신경증상 관찰)

동절기 소독약의 올바른 사용방법

- 소독약제에 쓰여 있는 희석비율(유기물 조건 등)을 정확히 숙지
- 겨울철 낮은 온도(4℃이하)에서는 효력이 저하되므로 희석비율(유기물조건) 고농도로 사용 권장
- 유효기간을 반드시 확인
- 산화제, 삼중염 등 사용 권장
- 소독약품은 조류인플루엔자 바이러스에 유효한 것(검역본부 홈페이지 참조)으로 사용



가금농가의 AI 발생을 예방하기 위한 농장 내 차단방역 수칙



육계, 육용오리 농가의 일제 입식 및 출하(ALL IN ALL OUT) 절차 준수

- (특별방역기간) 출하 후 14일 이상 휴지기 준수
 - 휴지기 기간 중인 농장에 대한 철저한 세척·소독 실시



농림축산식품부



농림축산검역본부



가축위생방역지원본부