


닭·오리농장 AI 차단방역 수칙

고병원성 조류인플루엔자(HPAI)
철저한 차단방역과
주기적인 소독실시로
예방할 수 있습니다.



❶ 농장 출입금지 표지판
설치 및 통제



❷ 농장에 출입하는 차량
출입 전·후 소독 실시



❸ 농장 출입 전후
소독(특히 손, 신발)
및 환복



❹ 축사 내·외부 소독



❺ 사료빈 주변 사료
즉시 제거,
주기적으로 소독 실시



❻ 쥐·야생조류 등
침입 방지용 헨스,
그물망 설치



❼ 축사 출입 전 환복,
신발 교체를 위한 전실 설치,
축사 출입구 발판소독조 설치



❽ 장비 등 철저히 소독



AI 의심가축
발견시 신고처

관할지자체 ☎ 1588-4060

농림축산검역본부 ☎ 1588-9060



농림축산식품부



농촌진흥청

고병원성 AI 차단방역 시 생석회(CaO) 사용요령

생석회는 1차적으로 열반응(약 200℃)에 의한 병원체 사멸, 이후 강알칼리 (pH11~12) 작용으로 소독효과가 있고, 쥐 등 야생동물 차단효과도 있음

살포장소

- (소독) 농장진입로, 축사 바닥 또는 토양 (오염원 제거가 주목적, 차량바퀴는 부수효과)
- (구서+소독) 농장 울타리 밖, 축사 외부

살포기준

- 살포량 : 1㎡당 300~400g (두께는 지면으로부터 약 2cm)
- 반드시 수분이 있는 상태에서 바닥이 보이지 않을 만큼 충분히 도포
- 살포폭 : 약 2~3m (농장 진입로는 최소 차량바퀴 1회전 이상의 폭)

살포방법

- 땅바닥에 소량의 물을 골고루 뿌린 후 생석회 충분히 살포
- 최소 1주일 간격으로 반복 살포
(생석회가 굳어진 경우 1주일 전이라도 걷어내고 재살포, 비나 눈이 온 경우 다시 살포)
- 굳어 있는 상태에서 다시 뿌리면 효과를 볼 수 없으므로 바닥을 드러내게 긁어 낸 다음 소량의 물을 뿌린 후 다시 살포
- 생석회는 쥐 등 야생동물에 기피효과가 있으므로 쥐 등 출입차단을 위해 위험 또는 발생지역인 경우 농장 울타리 둘레로 살포 권장 (폭 2m 및 두께 약 2cm)

주의사항

- 반드시 과립형 생석회를 사용할 것
- 바람이 불 때는 눈·피부에 접촉되어 사고 우려가 있으므로 주의 필요
- 다량을 뿌릴 때는 눈에 들어가지 않게 방독면과 밀폐안경 착용
- 생석회는 알칼리성이므로 생석회 위에 산성소독약을 뿌리지 말 것